



MICONAZOLNITRAAT 20MG/6 KRING

HYDROFIELE CRÈME / STROOIPOEDER

Tot welke groep geneesmiddelen behoort miconazolnitraat?

Miconazolnitraat behoort tot de groep antischimmelmiddelen. Deze middelen zijn werkzaam bij infecties die worden veroorzaakt door schimmels en gisten. Miconazolnitraat heeft tevens een antibacteriële werking tegen een beperkt aantal bacteriën.

Registratiegegevens

De registratiehouder van dit geneesmiddel is Kring-apotheek BV, Postbus 230, 5201 AE 's-Hertogenbosch. Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:

- RVO 26489 = 15381, Miconazolnitraat 20mg/6 Kring, StrooiPoeder.
- RVO 26488 = 15382, Miconazolnitraat 20mg/6 Kring, Hydrofiële crème.

Waarvoor wordt miconazolnitraat 20 mg/6 Kring gebruikt?

Miconazolnitraat wordt gebruikt bij infecties van huid en nagels die veroorzaakt worden door voor miconazolnitraat gevoelige schimmels en gisten.

Wanneer mag miconazolnitraat 20 mg/6 Kring niet worden gebruikt?

Dit geneesmiddel mag niet gebruikt worden bij overgevoeligheid voor miconazolnitraat of een van de andere bestanddelen van de hydrofiële crème/strooiPoeder.

Kan miconazolnitraat 20 mg/6 Kring tijdens de zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt?

Miconazolnitraat kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiks-aanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding.

Heeft miconazolnitraat 20 mg/6 Kring invloed op de rijpbaarheid en het reactievermogen?

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van miconazolnitraat op de rijpbaarheid en de betrouwbaarheid om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Waar moet u op letten als u ook andere geneesmiddelen gebruikt?

- Sommige geneesmiddelen kunnen bij gelijktijdig gebruik risico's werking en/of bijwerkingen beïnvloeden. Vertel daarom uw arts of apotheker altijd welke andere geneesmiddelen u gebruikt.
- Miconazolnitraat kan overgevoeligheid voor of vermindering van antistoffen tegen verwante anti-schimmelmiddelen (zoals toornazol, hexaconazol, ketaconazol) veroorzaken. Omgekeerd kunnen deze verwante anti-schimmelmiddelen dat voor miconazolnitraat het gevolg hebben.

Waar moet verder op worden gelet?

- Indien na 14 dagen geen verbetering optreedt of de klachten zich verslechteren, dient u een arts te raadplegen. Vertel uw arts welke geneesmiddelen u gebruikt heeft en hoe lang.
- Benzolzuur en benzofenon irriteren de huid, ogen en slijmvliezen. Niet aan het risico op geïrriteerd bij jaszakjesgenen verpakking.
- Het dagelijks wassen van de geïnficeerde huid is noodzakelijk.
- Alle voorwerpen die met de geïnficeerde huid in aanraking komen (bijv. handdoek, borstelje, washandje en nagelknipper) dienen uitsluitend voor persoonlijk gebruik voorbehouden te worden.
- Bij de behandeling van infectie aan de voeten is het aan te bevelen de voeten eerst te wassen en de schillen te verwijderen.
- Om herinfectie vanuit de schoenen te voorkomen 1 tot 2 x per dag miconazolnitraat 20 mg/6 Kring strooiPoeder op de geïnficeerde huid strooien, vooral tussen de tenen, en eventueel ook in kousen en schoenen.

Hoe moet de hydrofiële crème/strooiPoeder worden gebruikt?

- De hydrofiële crème dan aanbrengen op de geïnficeerde voeten en/of nagels, daarna afwassen.
- Het strooiPoeder op de geïnficeerde huid en eventueel in kousen en schoenen strooien.

Welke dosering?

Bij huidinfecties:

- de crème 1 tot 2 x per dag dan aanbrengen en afwassen.
- Bij de behandeling van huidinfecties aan de voeten is het aan te bevelen om tegelijkertijd en als nabehandeling dagelijks wat poeder op de gangbare huid, vooral tussen de tenen, en eventueel ook in kousen en schoenen te strooien.
- de behandeling dient onderbroken te worden voorziet tot de huidafwijking geheel is verdwenen (meestal na twee tot vijf weken).
- Wanneer alle spoor van de behandeling verdwenen is, dient de behandeling nog circa 10 dagen nauwgezet voortgezet te worden om de mogelijke terugval van de klacht te voorkomen.



Bij nagelinfecties:

- de geïnfecteerde nagels zo kort mogelijk knippen;
- de crème 1 tot 2 x per dag dun aanbrengen en afsmeren;
- de nagel afdekken door middel van een niet-geperforeerde hechtpleister;
- de behandeling dient ononderbroken te worden voortgezet, ook na het loskomen van de geïnfecteerde nagel (meestal na twee tot drie weken), totdat hergroei van een gezonde nagel en volledige genezing zijn opgetreden (meestal na ongeveer 32 weken).

Wat te doen bij overdosering?

Bij een overdosering miconazolnitraat zijn nadelige effecten niet waarschijnlijk. Indien u een overdosering vermoedt, dient u een arts te raadplegen.

Welke bijwerkingen heeft miconazolnitraat 20 mg/g Kring?

Het gebruik van miconazolnitraat kan leiden tot lichte huidirritatie, roodheid, branderigheid en allergische reacties.

Waarschuw uw arts of apotheker wanneer u last ondervindt van een van de genoemde bijwerkingen of indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter.

Hoe kunt u dit geneesmiddel het beste bewaren?

- Bewaar de crème/strooi-poeder in de originele verpakking op een droge plaats bij een kamertemperatuur van 15-25°C.
- Op de verpakking staat de datum tot wanneer u de crème/strooi-poeder kunt gebruiken. De aanduiding 'Exp' op de verpakking betekent: Niet gebruiken na.

Houd geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen.

Uw oude geneesmiddelen kunt u leveren bij uw apothek.

Datum laatste herziening: mei 2001
B12
337.301.076-8/0008

MICONAZOLNITRAAT 20MG/G KRING

HYDROFIELE CRÈME/STROOIPOEDER

KRING · APOTHEKERS

Kring-apotheek BV,
't Hartwegbeek



Als apothek hebben wij er veel waarde aan u te informeren en adviseren over geneesmiddelen en gezondheid. Deze bijsluiter bevat belangrijke informatie over het gebruik van dit geneesmiddel. Lees de tekst zorgvuldig door! Ook indien u reeds eerder miconazolnitraat 20 mg/g heeft gebruikt; de informatie kan door nieuwe bevindingen of veranderende inzichten zijn gewijzigd. Mocht u na het lezen van de bijsluiter nog vragen hebben, wordt dan niet om contact op te nemen met Uw apothek.

Wat zit er in de hydrofiele crème/ strooi-poeder?

1 gram hydrofiele crème/strooi-poeder bevat 20 mg miconazolnitraat.

Als hulpstoffen zijn getrukt:

- strooi-poeder: zinkoxide, talk, siliciumdioxide
- hydrofiele crème: ethyleenglycol, polyoxyethyleenglycol palmiïtostaat, amibisadipole propylglycolylseerde glyceriden, paraffine, benzozuur (E210, 2mg/g) en water.

Vergakkingsvorm

- De hydrofiele crème is verkrijgbaar in een tube van 30 gram.
- Het strooi-poeder is verkrijgbaar in een flesje van 20 gram.